

ZATAJIVANJE SRCA

POSTUPNIK ZA DIJAGNOSTIKU ZATAJIVANJA SRCA – HRVATSKE SMJERNICE 2016.

MOGUĆI POKAZATELJI ZATAJIVANJA SRCA

ANAMNEZA

- ZADUHA U MIROVANJU I/ILI NAPORU
- ORTOPNEJA / PAROKSIZMALNA NOĆNA DISPNEJA
- UMOR / DULJI OPORAVAK NAKON NAPORA
- ARTERIJSKA HIPERTENZIJA
- ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (raniji infarkt, revaskularizacija)
- KARDIOTOKSIČNA TERAPIJA / ZRAČENJE
- POTREBA ZA DIURETICIMA

FIZIKALNI NALAZ

- PLUĆNI ZASTOJ
- OBOSTRANO OTEKNUĆE GLEŽNJEVA
- SRČANI ŠUM
- DILATACIJA VRATNIH VENA / HEPATOJUGULARNI REFLUKS
- LATERALNI POMAK / PROŠIRENJE IKTUSA
- TREĆI SRČANI TON – GALOP

EKG

- PATOLOŠKI NALAZ ILI ABNORMALOST

**procjena vjerojatnosti zatajivanja srca
AKO JE PRISUTAN \geq 1 POKAZATELJ**

NATRIURETSKI PEPTID (NT-proBNP)

**NT-proBNP \geq 125 pg/ml
(neakutna prezentacija)
NT-proBNP \geq 300 pg/ml
(akutna prezentacija)**

Normalan nalaz –
razmotriti dijagnozu
različitu od zatajivanja srca

ULTRAZVUK SRCA

indiciran samo **ako su povišeni natriuretski peptidi** ili njihovo određivanje nije dostupno u rutinskoj praksi

**Poremećaj strukture
i funkcije srca**

Normalan nalaz (uključujući
volumene i funkciju klijetki
i pretklijetki) –
razmotriti drugu dijagnozu

potvrda zatajivanja srca

ZAPOČETI LIJEČENJE i DEFINIRATI ETIOLOGIJU

Prema: 2016. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016; 37: 2129-200.

U suglasju Hrvatskog Kardiološkog društva, Hrvatskog društva za hipertenziju i Koordinacije Hrvatske obiteljske medicine



**HRVATSKO
KARDIOLOŠKO
DRUŠTVO**



Hrvatsko društvo
za hipertenziju



KoHOM
koordinacija hrvatske
obiteljske medicine